Ferle de Mocammedes

Vass7R02s406-410

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp366

Just of Macounty

Ferle de Mocammedes 10 R94-366-370 X

dontodontodontodontod









ANNEE: 1993

NOM Ferle de Mocammandes EMPLACEMENT 10 R90-366.370.

B 13.89 mi

٧4

|           |              | -                            |                                 |       |                |   |  |   |   |   |               |                        |
|-----------|--------------|------------------------------|---------------------------------|-------|----------------|---|--|---|---|---|---------------|------------------------|
| uche      | Nbre<br>yeux |                              | rrement<br>mi/déb               |       | Ferti-<br>lité |   |  |   | Véraison<br>début mi/v fin                        |   |               | Maturité               |
| 1 2 3 4 5 | 5 5 6 6 5    | 22.3<br>22.3<br>22.3<br>22.3 | 1.4×<br>29 57<br>25,3×<br>29,3× | 0 432 | 4              | 27.5<br>: G -<br>TG - (disc-<br>: B-(s)-<br>: ave | 30.5<br>M - P<br>Mil<br>G - M<br>sph-el<br>Gr-Rs-<br>m - a | Dim<br>1:0<br>- P Dil<br>1-ov-(Rg-N)<br>r - for | 3,8<br>:15<br>im :24<br>obov-cy<br>Jus<br>ox - he | 29<br>+3<br>Compa<br>a24<br>yl-fus<br>: inc | 17,8<br>cité: | 6 9<br>+4<br>: L - M © |
|           |              |                              |                                 |       |                |   |  |   |   |   |               |                        |

AMMER: 1994 NOM Ferle de Mocammedés EMPLACEMENT 10 R 3 1366.370 B13.89 mi Nbre Débourrement Nbre yeux début mi/déb grap Ferti- Floraison Véraison lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité 10-3 14.3 26.5 30,5 6.8 16.8 23.8 59 7.3 10.3 1 3 4 7.3 10.3 1 1 Compacité : L - C Grappe : G TOM - P Dim : 18 Mill :015 4 3,3 10,3 2 Pour : 0 Baie: TC - G - M - P Dim: 22 73 11340 disc(sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : ind - coloré Saveur : (8)- m - ar - fox - herb Pépins : (avec) - apyrène ) le 10.3, 94 (+3) Vigueur : 3 Fort : 1 euge

NOM Forle de Mocammeder EMPLACEMENT 10 R9 1 366.370 6

| Souche   Nbre   Débourrement   Nbre   Graphe   Ferti   Floraison   Véraison   Maturité    1   |        |          |                              |                           |                                  |  |  |                                  |                            |       |      |                  |
|---|--------|----------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|-------|------|------------------|
| 2 4 20.3 23.3 2 48 +8 +4 +3  3 4 13.3 20.3 5  4 13.3 20.3 6  5 4 13.3 20.3 6  6 Pour : Mill :  8aie : TO - G - H - P Dim:  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  Saveur : s - m - ar - fox - herb  Pépins : avec - apyrène  Fort : A ent Vigueur : 4 | Souche |          |                              |                           |                                  |  |  |                                  |                            |       |      | Maturit <b>€</b> |
|   | 3<br>4 | 4 4 4 20 | 20,3<br>13.3<br>13.3<br>13.3 | 23,3*<br>20,3 *<br>20,3 * | Grappe Pour: Baie: Couleu Saveur | : G  TC - 0  disc-sp  r : B-0  : s  : avec | M - P  Mil  G - M  ph-ell  Gr-Rs-  m - a  c - ap | Dim  1: - P I -ov-ol Rg-N r - fo | Dim: bov-cy:  ##s  ox - he | Compa | cité | : L - %- (       |

Ferle de Mocammedes 10 R95.366.370 4.3 N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

# (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183) - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198,

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 > sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 2/10 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

# Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221) - velouté 222 - aranéeux 223) duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

#### Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.)

A pétiole glabre 234) - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

dinatan haataa haataa haataa 1

Ferle de Mocammédes 10 R9A-366.370 Act

Nº d'ordre :

Désignation : Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - oftelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: <u>dos</u> coloré 254 - à raies 255) - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258)- vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 }- vert 265.

### (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Ferle de Mocammedes 10 R91-366,370 A12

N° d'ordre Désignation : Emplacement :

#### FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143,

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté -

aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux 151 /- velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 / grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 -

plissée au point pétiolaire 161. Nervures : Face supérieure : verte 1/63/- point pétiolaire rouge 164 -

partiellement rouge 165 - entièrement

rouge 166.

Face inférieure: verte 167 - partiellement rouge 168 - Petidone entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

#### PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172. Glabre 1/73 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 92

Ferle de Mocammedes 10 R91-366,370 s.2

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 46 x Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long (6.) A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

### BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 / Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 22 x22). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 non déprimée 111. A saveur neutre 1/2 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121, A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 1/28/- peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 181 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 184. A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 189 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

nlantanlantanlantanlantan)

Ferle de Mocammedes 10 R9 s-366.370 A.1

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

#### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). ; saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvo 92

d'ordre: Herle de Mocammedes

ésignation: 10 R 9 4 3 66, 370

```
: (1)-(2)-3
Angle des nervures
Sexe
                                  : (7 - 8 - 9
61/1
                                  : 10 - (11)
C2/L
                                  : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Nombre de lobes
                                 : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                  : (21) - (22) - (23) - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                  : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                   : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                   : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                  : 271
                                   : (40) - 41
Dents : forme
                                   : 42 - (43) - (44)
Dents (angle)
                                  : 45 - 46 - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60 - 61 - 62
                                 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 93